

FAQs FontUp

¿FontUp cápsulas, se puede dar de noche indistintamente que de mañana?

- Efectivamente. El extracto de té verde es descafeinado y por tanto no debería intervenir en el sueño.

¿FontUp funciona, aunque no se apliquen los protocolos de estimulación cognitiva de 2-3h/semana que fueron propuestos durante la investigación previa llevada a cabo?

- La recomendación es la de realizar esos protocolos de estimulación cognitiva adicionales a el propio ejercicio cognitivo que se realiza en el día a día.

¿Cómo nos planteamos hacer esa estimulación cognitiva?

- Existen varias plataformas tipo NeuronUp y FESKITS así como recursos online.


¿A partir de qué edad es seguro usarlo?

- Actualmente la indicación es a partir de los 16 años. En vista de los resultados del estudio PERSEUS en población pediátrica es posible que la indicación del rango de edad aumente. La recomendación es consultar a su médico si quiere iniciar el tratamiento.

¿Necesita acompañamiento médico? Antes se decía que se debería tomar con acompañamiento médico para ajustar la dosis a cada edad dado que podía afectar al hígado y/u otros órganos del cuerpo.

¿Eso es cierto?

- FontUp es un complemento alimenticio y no un medicamento. La recomendación es que el médico o especialista clínico haga valoración y seguimiento del tratamiento. En el estudio de fase 2 no se encontró diferencias significativas del grupo placebo y el grupo de tratamiento en cuanto a efectos adversos relacionados con la tiroides o hígado.



¿Cuánto tiempo hay que tomarlo? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto?

- Se recomienda iniciar el tratamiento y prolongarlo 3 meses para destacar beneficios. La toma de FontUp debe ser continuada y en acompañamiento con ejercicios de estimulación cognitiva. Siempre que se muestren mejorías, se deberá seguir con el tratamiento.

¿Qué seguimiento medical se aconseja hacer con el FontUp?

- Se recomienda realizar un análisis completo y revisar la función tiroide y hepática al cabo de 3-6 meses.

¿Cuántas veces podemos dar el complemento?

- La dosis estimada según el estudio de fase 2 (TESDAD) es de 10 mg de EGCG/kg de peso corporal/día. En función del peso deberá calcular la dosis adecuada y mantener el cumplimiento del tratamiento.
- Por ejemplo, si su hijo pesa 30 kgs, debería administrarle 3 cápsulas (100 mg EGCG/cápsula) al día, espaciadas y acompañando las comidas. Si prefiere el formato en polvo, ya incluye una matriz nutricional y podría administrar 1 sobre (250 mg EGCG) para el desayuno o merienda.

¿Se lo puedo dar a mi otra hija que no tiene síndrome de Down? ¿Qué efectos tiene?

- La muestra de estudio es en población con síndrome de Down y el tratamiento es seguro. Podría dárselo.

¿Las capsulas se pueden abrir para tomar lo de dentro?

- Se pueden abrir y el tratamiento sigue siendo seguro y efectivo. No tomar en ayunas. Se pueden mezclar con lácteos para enmascarar el sabor amargo.

Mi hijo no se puede tragar las cápsulas ¿Se le puede dar sobres o es para más mayores?

¿Alguna solución?

- Efectivamente podría administrarle los sobres. Sencillamente tiene que calcular la dosis necesaria y dosificar el sobre (polvo), diluirlo en agua o leche y listo.